

梁如鍊此來情以柳巷正是急情。

9.4号

梁水鎮公社梁水鎮大隊青年試驗坊：

棉農在額丰產田和一般丰產田的情況：

全坊共男女青年20名，其中有10名女青年和10名男青年管理着5畝額丰產田23畝一般丰產田。自種到現在，經過了六個月的時間，听了黨的指示，按照黨的指示，鼓足了干劲，產心學外地經驗，加強了管理，以開花結果。去歲夏收，事收在望，初步的有領導和老農和技術員的驗收后，証明，經核算計算，額丰行巨平均18尺，棵巨平均4寸，畝共有4170棵。丰產棉行巨平均18尺，棵巨對徑落實畝4300棵。

現在的生育情況：①額丰產田，有果枝每棵平均~~24~~24個，棵之5尺，每棵平均有成鈴3斤，有鈴重26斤，按50斤一斤籽棉，每畝能收3023斤。②丰產田每畝平均430棵，每棵現有果枝15本，每棵平均24個桃，12個花蕾，按100斤桃平均一斤能產162斤籽棉。

我们最近这样播种的结果其措施是：

1. 正地情况：一梁翻3尺，时间是在3月2号开始，22号结束，每亩施基肥35500斤，其中有厩肥

248斤、大粪2000斤、饼粕4000斤，分两层翻下，耙耱2遍，全部春耩一次，方法是开沟，沟深5寸

沟距2尺，沟后平整，耙透耩平，上松下实保水。 曹

2. 播种前的准备工作：

① 粒选种子，方法是用手把老籽比籽虫籽、小籽去掉，选后进行了晒种，时间是上午4点开始下午

3点结束，火温温水浸水，其方法是把种子放在60度的温里浸后放入凉水浸2-3天到播种前捞出晾干

在用0.5%的赛力散拌种，拌后用布袋盖包闷种皮软化有3-5%的发芽率即可播种。

3. 播种，时间是在4月13号，地温一般在平均12度，即可播种，深度一寸左右，每亩中施种量35-40斤，亩种量

亩产棉15号，播种后地温低了增加地温，即文范，进行了浅耕一遍，播种4天后雨又浇地，边

06 05

增加地温，7天种子发芽，立即一次，12天出苗，14天进行第一次除草，用手间手

一次，巨立时陵子进行踏，踏后松土，当棉苗生长2-3片真叶时进行了定苗，并进行了3次

(代兰子尺子为带) 并随及进行踏和松土，定苗的巨立进行距1尺棵距时，每亩4400棵。

田间管理：从翻棉苗时开始施肥，到目前为止，已施肥9次，共施肥115斤，其中有化肥43斤

既肥粪肥和牛马粪40斤，过磷酸钙1000斤，沙内有20斤的过磷酸钙。

(2) 浇水8次 (3) 施肥12次 老年掌握35天，一帮10天，一帮的要求，在到了未受虫害的声量(4) 翻

撒土1次 培土3次 (5) 在正扶方面及时有讨论。

5 在保心也有讨论，今年和往年同期比较，减少蕾铃脱落8-10%，主要采取了如下办法：

① 适当深部翻耕，是起到了有草比无草松土，这后草后必部的原则，在方法上起到了先浅后深

巨沙这样可控制棉株突发，防止落铃。(2) 及时正确的去处理，使必，使棉株有4-5  
的丰产。

下部果粒有3-4批 乾打去边(中部4-5上部2-3-4批) 办法(3) 根据情况适当控制  
数量 必须掌握中耕、深中耕 子培土高 办法(素减少) 液肥水保 播后地膜人高急 生发 特  
别是在雨季更应当注意一点(4) 子叶群决通(区变完) 适当打卷叶和叶(叶) 及时  
治虫 防止掉穗 为害 特别 ~~是~~ 是最早虫红 蝶 蝶和叶 的虫 在掌有根了有虫 必治 无虫  
不必防 治早了的方向 同时子叶 摘除 花 叶 后 向 根 以 工 授 粉 等 办 法 (5) 订期 喷 打 剂  
击 素 素 之 般 过 龄 较 轻 这样 基本上 达到了 少 落 粒 的 要求。

1959年9月3号总结